

Lettre d'information

numéro 1, octobre 2014

L'Equipe de recherche en épidémiologie sociale (ERES) constitue l'une des 7 équipes de l'Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique (UMRS 1136) labellisé par l'Inserm et Sorbonne Universités et créé à Paris en janvier 2014. Ses travaux et ses projets sont présentés sur son site : www.iplesp.upmc.fr/eres.

Notre programme de recherche comprend à la fois l'étude des inégalités sociales et territoriales de santé en tant que telles et l'étude de certains des déterminants de la santé qui contribuent à ces inégalités, notamment l'environnement géographique, les conditions de travail, les insertions sociales et les origines migratoires.

A l'heure où ces sujets sont reconnus comme des priorités des politiques de santé en France et en Europe, notre ambition est également de fournir des résultats de recherche qui puissent aider les professionnels et les décideurs à développer de nouvelles réponses vis-à-vis des risques sociaux émergents et/ou des groupes sociaux les plus vulnérables.

Les inégalités socio-territoriales de mortalité

Mortalité par AVC

Mortality following stroke during and after acute care according to neighbourhood deprivation: a disease registry study.


Grimaud O, Leray E, Lalloué B, Aghzaf R, Durier J, Giroud M, Béjot Y.
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014 [Epub ahead of print]

Comparaison européenne

Assessing the potential impact of increased participation in higher education on mortality: evidence from 21 European populations.

Kulhánová I, Hoffmann R, Judge K, Looman CW, Eikemo TA, Bopp M, Deboosere P, Leinsalu M, Martikainen P, Rychtaříková J, Wojtyniak B, Menvielle G, Mackenbach JP; EURO-GBD-SE Consortium.

Soc Sci Med. 2014;117:142-9.



La santé mentale

Dépression

Defining subgroups of low socioeconomic status women at risk for depressive symptoms: the importance of perceived stress and cumulative risks.

Van der Waerden JE, Hoefnagels C, Hosman CM, Jansen MW. Int J Soc Psychiatry. 2014. [Epub ahead of print]

Toxicomanie

Treatment for illegal drug use disorders: the role of comorbid mood and anxiety disorders.

Melchior M, Prokofyeva E, Younès N, Surkan PJ, Martins SS. BMC Psychiatry. 2014;14:89.

VIH/Sida et comportements à risque

Comportements sexuels sous traitement

Decrease in sexual risk behaviours after early initiation of antiretroviral therapy: a 24-month prospective study in Côte d'Ivoire.

Jean K, Gabillard D, Moh R, Danel C, Desgrées-du-Loû A, N'takpe JB, Le Carrou J, Badjé A, Eholié S, Lert F, Anglaret X, Dray-Spira R.
J Int AIDS Soc. 2014; 17: 18977.



Tabagisme

Tobacco Smoking in HIV-Infected versus General Population in France:
Heterogeneity across the Various Groups of People Living with HIV.

Tron L, Lert F, Spire B, Dray-Spira R; ANRS-Vespa2 study group.
PLoS One. 2014;9(9):e107451.

Les risques psychosociaux au travail

Comparaison européenne

Fractions of cardiovascular diseases and mental disorders attributable to psychosocial work factors in 31 countries in Europe.


Niedhammer I, Sultan-Taïeb H, Chastang JF, Vermeylen G, Parent-Thirion A.
Int Arch Occup Environ Health. 2014; 87(4): 403-11.

Absentéisme

Psychosocial factors at work and sickness absence: results from the French National SUMER Survey.

Lesuffeur T, Chastang JF, Sandret N, Niedhammer I.
Am J Ind Med. 2014;57(6):695-708.

Associations entre les facteurs de Karasek et le nombre d'épisodes d'absence chez les hommes



Santé et précarité



L'accès aux soins des sans papiers

Use of an emergency department in Saint-Laurent du Maroni, French Guiana: does being undocumented make a difference?


Jolivet A, Cadot E, Angénieux O, Florence S, Lesieur S, Lebas J, Chauvin P.
J Immigr Minor Health. 2014;16(4):586-94.

Le contrôle de la tuberculose en prison

X ray screening at entry and systematic screening for the control of tuberculosis in a highly endemic prison.

Sanchez A, Massari V, Gerhardt G, Espinola AB, Siriwardana M, Camacho LA, Larouzé B.
BMC Public Health. 2013;13:983.

Les comportements de prévention



Transport et activité physique recommandée


Active transportation and public transportation use to achieve physical activity recommendations? A combined GPS, accelerometer, and mobility survey study.

Chaix B, Kestens Y, Duncan S, Merrien C, Thierry B, Pannier B, Brondeel R, Lewin A, Karusisi N, Perchoux C, Thomas F, Méline J.
Int J Behav Nutr Phys Act. 2014;11(1):124.

Dépistage des cancer féminins

Are immigrants and nationals born to immigrants at higher risk for delayed or no lifetime breast and cervical cancer screening? The results from a population-based survey in Paris metropolitan area in 2010.

Rondet C, Lapostolle A, Soler M, Grillo F, Parizot I, Chauvin P.
PLoS One. 2014 Jan 22;9(1):e87046.



Questions méthodologiques

Scores de précarité

[Qualitative and quantitative comparisons of three individual deprivation scores for outpatients attending a free hospital care clinic in Paris].

Fouchard A, Bréchat PH, Castiel D, Pascal J, Sass C, Lebas J, Chauvin P.
Rev Epidemiol Santé Publique. 2014;62(4):237-47. French.

Comportements spatiaux dans les études de santé

Assessing patterns of spatial behavior in health studies: Their socio-demographic determinants and associations with transportation modes (the RECORD Cohort Study).

Perchoux C, Kestens Y, Thomas F, Hulst AV, Thierry B, Chaix B.
Soc Sci Med. 2014;119C:64-73.